

本草蒙筌

本草蒙筌卷之四

新安祁門月朋陳嘉謨廷采纂輯

門生

歙邑葉斐

鮑倚

校刊

婿胡一貫

姪景

木部

桂

味辛甘氣大熱浮也陽中之陽也有小毒採皮宜

冬至同餌忌生葱收必陰乾炆用旋咀片餘剝須

密紙重裹犯風免辛氣泄揚種類多般地產各處

楠

正圓無骨

形類

生交趾桂林

楠

區廣薄皮產南

海山谷

楠

品極高而堪克進貢却出觀賓勳名屬

說世人以觀字筆畫多懶書之故只作

木起皮極厚

官如馬黃藥作類字作姜同意亦通

而肉理麤虛乃發從嶺音因皮嫩如筒卷束音

謂皮老若板坦平音係至軟枝梢音指至厚脂

肉音枝梗小條非身幹麤厚之處音近木黃肉

但去外甲錯麤皮品分既明欺罔難入又各主治亦

須詳知箇桂筒桂相同一說箇筒字近似人養精神

和顏色耐老壯桂板桂一類堅骨節通血脉墮胎四

者性並辛溫難作風寒正治柳桂桂枝味淡能治上

焦頭目蕪橫行手臂調榮血和肌表止煩出汗疎邪

散風經云氣薄則發泄是也肉桂木桂性熱堪療下

焦寒冷併秋冬腹疼泄賁利水道溫筋煖臍破血

通經經云氣厚則發熱是也桂心美之之義性畧守

治多在中官桂貴之之辭味甚辛治易鮮表如此之
異蓋緣本乎天者親上本乎地者親下理之自然性
分所不可移也然柳桂桂枝入足太陽之腑桂心入
心在手少陰之經本經証云桂有小毒亦從類化與
黃芩黃連爲使小毒何施與烏頭附子爲使全得熱
性與人參麥門冬甘草同用能調中益氣實衛護榮
與柴胡紫石英乾地黃同用却主吐逆與巴豆礪砂
乾漆穿山甲水蛭蜜蟲如此有毒之類同用則小毒
化爲大毒矣春夏禁服秋冬宜煎

謹按諸桂所治不同無非各因其材而致用也然
本經謂桂止煩出汗仲景治傷寒乃云無汗不得

服桂枝又云汗過多者桂枝甘草湯是又用其閉
汗何特反其經義耶抑一藥而二用耶噫此正所
謂殊途而合轍也蓋桂善通血脈本經言桂止煩
出汗者非桂能開腠理而發出汗也以之調其榮
血則衛氣自和邪無容地遂自汗出而解矣仲景
言汗多用桂枝者亦非桂枝能閉腠理而止住汗
也以之調和榮衛則邪從汗出邪去而汗自止矣
昧者不鮮出汗止汗之意凡病傷寒便用桂枝湯
幸遇太陽傷風自汗者固獲奇効僅係太陽傷寒
無汗者而亦用之爲害豈淺淺乎猶有謂仲景之
治表虛而一槩用歛虛汗者此又大失經旨矣

補遺

味甘辛氣平無毒近道俱有乾州

獨佳

獨佳

獨佳

屋

邊者為宜塚上者切忌霜後採實去殼取仁先以鹽酒浸曝乾次取黃精汁和煮執筋連攪盡汁纔休研細成霜入劑方効畏羊菊麴麴諸石羊蹄根菊石白麴一切石使牡蠣瓜子桂皮聰耳目卻風寒濕痺止疼益氣血去恍惚虛損欬汗治腎冷腰冷併膀胱冷膿宿水潤腎燥體燥及面頰燥澁不光與陽道殺百邪止驚悸安五臟頭風眩痛亦可煎調久服不饑增壽耐老○**苦澁**翠隱者採收務向月令建方春採東夏採南秋冬採北做纔得節候生氣即止吐衄崩痢重生髮鬢續眉為燥濕僊丹係補陰要藥若合黃連煎服小兒蟲痢宜

疰疰燒灰敷火灼爛瘡長毛髮亦驗疰醪酒主

歷節風痺歷節風痺療藥光靈凡患疥瘡者及牛馬畜產有疥並燒點二三次無不愈

黃芩味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒黃芩樹尚蜀

產校夏收擇肉黃緊厚為優去外褐麤槌黃芩製先

漬蜜水日際曝乾次塗蜜糖火邊炙燥惡乾漆治三

焦二製則治上焦卑製則治中焦不製則治下焦也

乃足少陰本藥又足太陽引經加黃耆湯中使足膝

氣力湧出痿痹即差和蒼朮散內即散俾下焦濕熱

散行腫脹易退佐澤瀉利小便赤澁配細辛細辛舌額

紅瘡一方同青黛研細入安廬熾虻蟲濕隱伏龍火

鮮消渴除骨蒸補腎強陰洗肝明目腸風連下血者

存字異
本作薦

立効熱痢先見血者殊功去臍腹內虛疼逐膀胱中
結熱女人帶漏亦可治之○**根名****黃連**如苓結塊療
心腹百病主長生神倦不渴不饑安魂安魄

黃連按內經云腎苦燥故腎停濕也活人鮮毒湯用
黃蘗黃連黃芩梔子蓋梔子黃芩入肺黃連入心
黃蘗入腎燥濕所歸各隨其類而然也上下內外
並可治之積熱門中誠爲要藥至今醫家氣虛用
四君子血虛用四物有痰用二陳有熱用鮮毒故
常宗述而不易焉

黃連


味甘氣寒無毒近道雖有滎陽屬湖獨多每產

療用又名穀實葉類蒲萄作瓣實如彈子結蓬初生

綠青漸熟紅赤待深秋採摘浸水以去皮瓢取中子
曝乾投酒再浸晝夜務蒸從巳至亥任用煎膏爲丸
陰痿能強水腫可退克肌膚助腰膝益氣力補虛勞
悅顏色輕身壯筋骨明目主小兒身熱食下即使
生肌煎逐水利便浸爛又可作紙煮澡洗癰瘡
立敗反惡存收塗癰更敷蛇咬○燒存性調
酒亦止血暈血崩剪有印紙燒吞嚙門中有紙斷婦人
產神効

誤按楮有二種名亦不同葉有瓣曰楮葉無瓣曰
構音一說皮斑者楮皮白者構多生久癆穀田結
實味甘又因名曰穀實也詩云爰有樹檀其下維

穀是爾。即今國州猶云穀桑。荆楊交廣咸謂之櫟。每逢秋月剝取其皮或織爲履穿或搗作紙賣色甚光澤。媒利無涯。所入醫方惟貴其實赤者頻服不老不饑筋力倍增。行及奔馬。並載經註決無欺人。奈何滋補藥中用之稀少。惜哉惜哉。



味甘淡氣平寒陰中微陽無毒竹類頗多難

指何是惟筍味淡者爲然。筍竹雷竹水竹味淡兼甜治病第一。筍竹籜竹味皆純淡採用亦宜。苦竹紫竹苦辣而類不堪入藥。東坡蘇公云淡竹者對苦竹爲文除苦竹之外皆淡竹也。迹此觀之足可徵矣。逐上氣欬逆喘促退虛熱煩燥不眠專涼心經尤卻風。

痘一種草類如鐵線莖似嫩稷葉長尺餘亦名 止

消渴散毒補虛通神明輕身益氣 削去青色

惟取向裏黃皮主胃熱飢逆殊功療噎膈嘔噦神効

○原亦竹皮刮下大編編用程漏處極多取

乾煮之亦止諸血○苑取 與荆瀝同橫截尺

餘直劈作數塊兩磚架起紫火中烘瀝從兩頭流來

少加薑汁調服每瀝一盃加生薑自然汁二匙 卻陰虛發熱理中風

噤牙小兒天吊驚癇入口便定婦人胎產悶暈下咽

即甦衍義云胎前不損子產後不得虛止驚悸卻痰

涎痰在手足四肢非此不達痰在皮裏膜外有此可

毆但世俗反以大寒置疑不用殊不知係火燉出又

佐薑汁有何寒乎。○竹肉狀如肉，鬱每生苦竹枝上，
鷄卵般大，生啖毒多，戟人喉，頰來紅，且令爪甲變黑。
須灰汁煮鍊三度，然後依常菜食之，殺三蟲，破老血，
別有功效。人未盡知。○竹葉性盛夏間，狀類鹿角色，
白，係慈竹逢雨滋潤，每滴汁着地，發生同薑，醫瘡，
痢赤白治驗。○節內黃粉，即竹粉，俗云天竺，旋飛，
塵沙結成老竹間，或可得形類黃土，一名竹膏，治小
兒急慢驚，抽瘵肥人，卒暴風中，鎮心明目，解熱散邪。
○竹葉發氣托痘瘡，更止消渴利小水。○竹葉苦
有毒，類不廣竹若用搗成膏，六畜皮肉生蛆，納入
煮出灰汁，煮纔可食，不爾亦戟人喉。○更有

味鹹是笋成竹時立死色黑如漆收宜夏初惟苦星
竹多生專主噦氣嘔逆大人翻胃反食以水煮薑小
兒驚癇夜啼安身伴睡痔漏去血燒末湯吞○

齒

亦載醫方治活蟲入腹爲病狀如癰癥煮服即除

松脂

味苦甘氣溫無毒普天下植發州土不拘大木

中流來歷清松脂便是採取媒利鑿多竅可遂貪心
鍊餌延年待自流易奏捷効擇通明成顯分向背陰
陽向南日月照者爲陽脂向北日月背者爲陰脂陽
脂補陽陰脂補陰僊經亦云不見日月者皆可取服
以人多陰虛欲其專補陰爾製鍊有方依式勿錯水
盛釜內甑安水傍白茅藉甑底兩層黃沙蓋茅上寸

許松脂任布桑柴緊炊湯減少旋添脂流盡方出新

箴筒掠投冷水者沉盆臚候凝結復炊如前過畢三廻

色白如玉研和群藥加白茯苓相子仁共劑亦可單服爲丸酒吞

逐諸風安五臟除伏熱胃脘鮮消渴咽喉輕身通神

延年耐老熬膏貼瘡毒長肉作散治齒痛殺蟲主

少氣虛羸熱毆風痺雖輕身益氣發熱上焦

苦收曬乾研末羅細雞清離彈丸成豆粒暑痢止澁

如神主辟穀不饑補虛損勞乏性溫燥血

中之濕卻脚痺軟疼味苦溫能生毛髮搗爛敷風

濕瘡効懸掛辟瘟疫氣靈歷節諸風漬酒可服

一名女羅詩云葛與女羅施于松上陶云苦甘無毒
葛是寄生堂用桑上者女羅當用松上者

煎濃可作吐湯。湧客痰。截溫瘧。利水道。毆頭風。掃頂上瘡。痰去項間。癰癭。虛汗堪止。嗔怒能消。

茯苓

味甘淡。氣平。屬金。降也。陽中陰也。無毒。近道俱

有。雲貴。雲南。獨佳。產深山谷中。在枯松根底。由木被斧斤砍伐。或老遭風雹折摧。枝葉不復上升。津氣旋向下泄。凝結成塊。乃名茯苓。因其本體相離。故取附之。之義小如鵝卵。大若匏瓜。猶類龜鼈人形。並尚沉重結實。四五斤一久藏。晉自無朽蛀。初收採。須仗陰乾。咀片水煎。黑皮淨削。研末九服。亦筋盡淘。茯苓中

最得目為九散。久服者。研細末入細布袋中。以冷水揉擺。如作葛粉狀。密取粉而煎。滓在袋中者。棄去。不用。若煎湯。方益心脾。不損眼目。忌酸物。惡白飲。仍畏

牡蒙地榆雄黃秦元龜甲種赤白主治畧異經上下
行走自強補腎入心脾小腸屬巳丙丁瀉利專主
補腎入膀胱腎肺屬辛壬癸補益熱能甘以助陽
淡而利竅通便不走精氣功並車前利血僅在腰臍
効同白朮爲除濕行水聖藥乃養神益智僊丹生津
液緩脾歐痰火益肺和魂鍊魄開胃厚腸卻驚潤安
胎孕久服耐老延年不饑僊汗多陰虛者誤煎傷元
夭壽若小便素利者過服助燥損明暴病有餘相宜
久病不足切禁凡須細察不可妄投○附結本
根因津泄少謂既不離其本故此爲名體比苓畧鬆
皮與木須去所忌畏惡悉倣於前專理心經善補心

木部卷之四
氣止恍惚驚悸除患怒健忘心木名黃連載經偏風致口啞僻治驗

謨按經註有曰松木既樵根尚能生物者何也蓋因精英未淪沾其土氣不能不爲物爾正猶馬勃菌蕈五芝木耳石耳之類多生枯木潤石糞土之上則可知焉其上菟絲下有茯苓之說甚爲輕信者矣又曰茯苓爲在天之陽陽當上行何謂利水而瀉下也經云氣薄者陽中之陰所以茯苓利水瀉下亦不離乎陽之本體故入手足太陽經焉丹溪又曰茯苓豬苓澤瀉各有行水之能又服損人八味凡用之亦不過接引諸藥歸就腎經去胞中

久積陳垢以爲搬運之功也

第一卷白朮疑後謨按宜參看

琥珀

味甘氣平屬金陽也無毒出自松脂所化入土

千歲纔成初如桃膠久漸堅硬西戎多產色淡澈光

南郡亦生色深重濁

故昔能激光爲詩入藥難重濁不爲

手摩熱可拾

草木湯煮軟儼若錫糖遇物卽粘如是方妙今市家

多煮鷄彈及青魚枕造成不可不細察爾入藥研末

用湯調吞利水道通五淋定菟兔安五臟破癥結瘀

血殺鬼魅精邪止血生肌明目摩腎治產後血暈及

兒枕疼療延爛金瘡併胃脘痛○又種**墨**者名異產

同狀似玄玉而輕質亦松脂化出歷二千載方得成

形安神補心益佳生肌破血尤善不堪造噐見風折
開小兒帶之謂能辟惡

漢按丹溪云古方用琥珀利小便以燥脾土有功
蓋脾能運化肺得下降故小便可通也若血少而
小便不利者用之反致燥急之患不可不謹別說
又云茯苓琥珀皆自松出而所稟各異茯苓生成
俱陰琥珀生於陽而歲於陰故皆治熱而安心利
水其効同也



味辛無毒擇係松煙造成摩入藥劑主治煙細繞
効煙麤不靈其桐油煙石油煙併藥草灰偽爲者俱
不可以治病也止血果捷因黑勝紅故天行熱毒鼻

衄下血數升。水摩滴入。若產後血暈。頭中卒暴來紅。摩醋服之。遊絲纏眼中。摩鷄血。速點客忤中腹內。摩地漿頓吞。下死胎。而逐胎衣。合金瘡。以生膚肉。

槐實

味苦辛。鹹氣寒。無毒。折枝挿地即活。人家多植。

門庭實生。莢中十月收採。粒大如豆。色紫而堅。一莢

兩粒。三粒者爲良。若係單粒五粒者。勿用。小銅鎚擊

碎。烏牛乳浸宵。蒸過。纔煎。景天爲使。主五內邪熱。去

五痔腫疼。

七月七日以上取。

搗絞汁貯銅器內。置高處曝。內三易止涎唾。補絕傷涼。大腸消乳瘕。除男子陰瘡。

之乃愈。濕癢不歇。卻女人產戶痛癢難當。仍理火瘡。且墮胎

孕。酒吞七粒。催產尤良。

煎代茶

去頭風

明

目補腦之藥。疎導風熱亦可取。搗煎葷白皮煮酒治風皮膚不仁服効。消陰疝卵腫卻壯熱驚癇。同總治瘡毒熬膏貼癰疽潰爛。煮汁漱口齒風疳根作神燭可燒仍主喉痺寒熱洗瘡住癢煨揩齒殺蟲。味甚苦炒黃亦涼大勝去熱理腸風瀉血及皮膚風止痔瘻來紅併赤白痢去胃脘卒痛殺腹臟蛔虻主諸風化涎任作湯散丸服卻風痺肢難舉動散風毒身如蟲行噤口急風殊功破腦傷風立効。係蘭亦樹所生堅如桑耳者良用作細末酒服去婦人陰中瘡瘻治痔瘻殺道血流。

味苦酸氣寒味薄氣厚陰也陰中微陽無毒商

州黃河所生似橘極小擇如鵞眼色黑陳者良新造

一種俗呼臭橘其皮微綠不堪藥用今市家每採皆為綠衣者欺世謀利無益有損故凡人藥劑必求黑

色為真也剉淨內瓢剉片熨炒用本與枳殼一物因收遠

近異名枳實秋收枳殼冬採今醫者不以此泥惟視

皮厚小者為實完大者為殼也殼大則性詳而緩治

高高者主氣治在胃膈實小則性酷而速治下下者

主血治在心腹故胃中痞肺氣結也有桔梗枳殼湯

之煎心下痞脾血積也有白朮枳實湯之用枳實

去脾經積血脾無積血則不痞也此高下緩急之分易老詳定以為

準的也除脹滿消宿食削堅積化稠痰破氣佐牽牛

大黃芒硝益氣佐人參乾薑白朮仲景加承氣湯內

取䟽通破結之功。卅溪入瀉痰藥中。有倒壁衝墻之
捷。**獨**治風中身直。久不能屈伸。**獨**主痔瘻來紅
及腸風臟毒。**獨**併收採水脹風痛齊毆。○其大
獨亦貴陳年。取翻肚如盆口唇。製剝瓢剉片。麩炒
瀉肺臟。寬大腸結氣。胃中兩脇虛脹者。急服。發疹肌
表。遍身苦癢者。宜加。逐水飲。停留關節並利。破痰癖
積聚宿食。亦推。同甘草瘦胎。**獨**和黃連滅痔。**獨**
能損至高之氣。不宜按迹服多。虛怯勞傷尤當全禁。

第七卷青橘皮疑後謨按宜參看

獨子青味苦甘氣平無毒。鄉落幽居多植。遮護
能欺霜雪。又名冬青。黑實遇冬至採收。衣皮將布袋

按淨酒浸一宿日曝待乾研末爲丸用旱蓮草熬膏
合妙搗碎漬酒同生地黄投罐煮良黑髮黑鬚強筋
強力安五臟補中氣除百病養精神多服補血去風
久服健身不老經云涼而無毒若漬酒每日飲亦益
肌膚經云煎可染緋又燒灰面膏塗能治癰瘰經云白
紋細函板堪爲○附樹枝結成係小蟲食樹
汁化者蟲類爲白脂經云路則成蠟人謂蠟果著樹而然非也
亦有不變蠟者則結苞枝上初如黍米新圓大青紫
宛若樹之結實土人呼爲蠟鍾來年春深則苞折而
蟲出延樹矣欲廣蓄者候苞將折時逢秋刮取以水
煮溶濾置冷器之中或濾冷水內亦可自然凝聚成
塊文理瑩澈不忝石膏本經原脫漏未書丹溪始珍

重纔用嘗與戴原禮簡云白蠟者稟氣收斂堅凝誠
為外科要藥生肌止血定痛按骨續筋補虛與合歡
皮同剪入長肉膏神効但未試可服否其合歡皮服
之驗矣蠟有二種蜜白蠟人可服餌本經石蜜款內
曾已載詳其真白蠟本經未載後因并溪此
簡有未試可服否一句通知言
白蠟取能治療蟲

棟
實

此蟲蠟也故採之以補脫漏
味苦氣寒有小毒蛟龍極畏堤岸多栽在

處有之川蜀獨勝木高丈餘畧大葉密如槐稍長花
紅紫甚香實青黃類彈待冬收採向日曝乾取肉堪
煎去皮去核一說將核搗碎漿水煮一伏時漉曬收
藏亦堪入藥大抵用核莫用肉用肉莫用核此常理
也主中濕傷寒大熱煩狂理膀胱小腸疝氣吊痛利

小便水道殺三蟲疥癩。性微寒。雌雄兩種。雄根赤無子。大毒忌煎。雌根白子多。微毒宜採擇向東者。纔入藥罈。畧刮外青。只留裏白。單味煎酒。大能追蟲。宜月前忌月後。月半前蟲頭向上。月半後蟲頭向下。先啖鷄彈餅。引蟲口開。頓飲濃藥湯。過晝卽利。多則成團。追下。少則逐條推來。積聚行。疼痛止。亦堪研細末。敷作癢蟲瘡。○又

石茱萸

卽花落子。外科亦用。醫者當知。

榧核

味甘。氣溫微寒。無毒。生函谷及巴西河東。類烏

豆。但畧圓而匾。外有紋理。六月採收。碎核殼取仁。去皮尖研爛。輔佐良藥。專治眼科。消上下炮風腫爛弦。除左右皆熱障努肉。退火止淚。益水生光。**葵子**啖之。

亦止鼻衄

厚朴

味苦辛，氣大溫，屬土，有火，陰中之陽，可升可降。

無毒。樹甚高大，榛乃別名。陝西川蜀多生。梓州屬四

出者獨勝。凡資治病，秋盡採皮，擇厚脂，顏色紫瑩佳。

去麁皮，薑汁炒，褐用。惡寒水硝澤礞石礞石硝使炮熟。

乾薑諸豆忌之。食則動氣。主中風寒熱，治霍亂轉筋。



止嘔逆吐酸，禁瀉痢淋露，消痰下氣，與枳實大黃同

用。實蒲能泄，溫中益氣，與陳皮蒼朮同用。濕蒲能除

與鮮利藥同用，則治傷寒頭疼。與洩痢藥同用，則厚

腸胃大抵。味苦氣溫，故用苦則泄，用溫則補。衍義云：

平胃散中，用之最當。既溫脾胃，又走冷氣，再隨證加。

減妙不可勝言。潔古亦曰：治腹痛脹滿散結之神藥也。儻患者虛弱，須斟酌少加。對證不真，誤服太過，則反脫人元氣，豈不慎哉？若氣實人服多，參耆致成喘悶者，正此泄除不在禁也。孕婦忌用。女科當知。○入醫方。又名散，結療鼠瘻，益氣明眼睛。

謨按：丹溪云：厚朴氣藥溫而能散，故泄胃中實也。平胃散用佐蒼朮，正乃泄去上焦之濕，不使胃土太過得復其平，致於和而已。非謂溫補脾胃焉。胃以成俗，皆謂之補。哀哉！然治腹脹者，因味辛能提其氣故爾。

根白皮

味甘而辛，其厚辛薄，氣寒，可升可降，陽中

陰也無毒山谷出少家園植多山桑質堅木堪作櫨

家桑氣厚葉可飼蠶凡入劑中須覓家者近冬收採

如式製精根出土外者殺人根向東行者得氣緇生

皮取近木洗淨留白去青片用銅刀咀成惡鉛忌鐵

稀蜜拌透文火炒乾為便續斷柱心入手太陰肺經

甘助元氣補勞怯虛羸辛瀉火邪羅謙甫曰桑白皮

和肺瀉肺氣也火止喘嗽唾血利水消腫解渴痰

月刃傷作線縫執鷄血塗即合皮取依四時

春夏取向上者從升枝餘皮秋冬取向下者因降根

汁敷金瘡血止剥白皮裏之良敷蛇咬毒消點唇裂

易蒸藥褐色不落盆中煎如糖赤老痰宿血並推

皮

採經霜者煮湯洗眼去風淚殊勝。搗敷蛇蟲蜈蚣
 咬毒。蒸搗罍撲損瘀血滯凝。煎代茶。消水腫。脚浮下
 氣。令關節利。研作散。湯止霍亂吐瀉出汗。除風痺疼。
 炙和桑衣煎濃。治痢諸傷止血。煎常飲。耳目聰明。
 去手足拘攣。脚氣。薰散潤皮毛。枯稿風癢。且毆陰管。
 通便。眼眵退。暈利。喘嗽逆氣。消嗽。癰癤。收曝乾。蜜
 和丸服。開利。數安魂鎮神。久久不饑。聰耳明目。
 絞汁。係桑精英。入鍋熬。稀膏。加蜜攪稠。濁退火毒。
 貯磁瓶。夜卧將臨。沸湯調下。每服一餅。金石燥熱止。
 渴。染鬚髮皓白。成烏。一方黑。盛封閉。懸屋東向。百日化為
 泥。染白鬚如漆。又方。取黑。盛二七。和胡桃
 脂。研如泥。按去白鬚點孔。中即生黑鬚。
 柴灰 辛寒

淋汁小毒合冬灰爲蠟藥醫外科著奇功。蝕惡肉死肌。滅痰疔黑痣。能結鉛汞。曾益丹家。○**桑黃**有毒。味其古方入劑屢用。一名桑菌。又名桑黃。老樹上多。雨即生。軟濕者作菹。堪啖。採收剉碎。醇酒煎。散血如神。止血甚捷。黑者主女人癥瘕崩漏帶下。及乳腫暴來。黃者治男子癰飲積聚腹疼。併金瘡初得。若色黃熟。陳白。止洩補益元陽。○**桑椹**非指桑椹花爲云。乃樹上白蔕。其狀因與地錢花相類。故假此立名。刀削取之。火炒入藥。性緩無毒。健脾泄腸。寒崩中。禁帶漏。鼻衄吐血。愈。腸風下血。安。○**桑葉**主卒心痛。金瘡潰爛。亦可生肌。○**生節**間生出。葉厚軟如橘。

葉莖肥脆類槐枝別樹雖有不重獨桑氣厚甚妙儻
求主治須認精詳或云碎其實有汁稠粘者真又曰
折其莖以色深黃者是固當宗此辨別仍貴纏附桑
枝外科散瘡瘍追風濕卻背強腰痛篤疾文科安胎
孕下乳汁止崩中漏血沉疴健筋骨克肌膚愈金瘡
益血脈長鬚長髮堅齒堅牙

〔寶〕

服通神輕身明目

謨按木部之中惟桑寄生最難得其真者必須近
海桑樹生意郁濃地暖不蠶葉無採捋節間自然
生出纏附桑枝採得陰乾乃可入藥其諸桃梅榆
柳檉櫟松楓等上間或亦有寄生不似桑木氣厚
假桑之氣以爲佳爾故凡風濕作痛之證古方每

用獨滑寄生湯煎調百發百中。今人服之杳無奏
其功者，豈非藥不得真之故歟？況古明醫用藥立
方，必以主病者爲君，所用川獨滑桑寄生俱能去
風勝濕，以爲主藥，誠爲合宜。柰今賣藥之家，因難
得真，往往收採雜木寄生，指爲桑寄生，媒利種，雖
同類，氣味大殊。且川獨活亦未辯認，分明每用土
當歸假代，兩俱燥性，耗衛敗榮，無益有虧，寧不增
劑，近幸焚山吳氏辯認獨滑原本荒滑一種，以節
密輕虛者爲羌，節疎重實者爲獨。川續斷與桑寄
生氣味畧異，主治頗同，不得寄生即加續斷，便立
名曰羌活續斷湯，使醫者不泥於專名，病家勿誤。

其假藥仁恩溥濟何其淵哉

椿木

味苦澁氣寒有小毒南北俱各有生其木

最爲無用本多壅腫難定墨繩枝乃曲拳不中規矩
與椿木相類須辯認分明無花不實木身大其幹端
直者爲椿有花而莢木身小幹多迺矮者爲樗又曰
椿木實而葉香樗木疎而氣臭今人不識樗名故多
呼爲臭椿樹也入劑挖東引細根刮外取白皮蜜炙
止女人月信過度久痢帶漏崩中禁男子夜夢遺精
滑洩腸風痔瘻縮小水敗蛔蟲其**葉**收採曝乾大便
去血尤効○**椿白皮**主疥蠱亦惟白者爲良止血功
同女科任用

謨按汪石山曰椿樗二木各有兩種一種皮赤一種皮白白者先花後葉其樹身皮麤糙如栗粒赤者先葉後花其樹身皮細膩而不麤葉皆相同香臭無別醫之所取皆在白皮故入藥無問椿樗但擇皮白者採收不必以香臭爲泥也



味甘氣平性滑利降也無毒多生山谷處處有之取向裏白皮旋曬乾入藥勿令中濕濕則傷人通水道除五淋壓丹石利關節搗和醞醋凡赤腫薄敷煎成膏鋪但寒麪連服老人服久多睡孕婦服即滑胎新剥搗爛如糊用粘瓦石甚固藥性敷癰殺蟲立效益壽丹石尤靈生服一兩頓効爲美日飲水腫即

消_○主小兒驚癇亦利尿管閉澁_○生有莢作蠶甚
香因味微辛肺氣能助殺諸蟲消心腹惡氣併卒心
疼療小兒塗痂花頭瘡及諸癰疥_○作羹少和牛肉
婦人食即止帶崩

秦皮

味苦氣寒沉也陰也無毒產陝西邠州及廬江

川谷木類檀木根同槐根葉如匙頭少光皮多白點

不糙

不糙也

俗因呼爲白櫟木又呼石檀樹苦樹咸取

像焉秋采採皮陰乾待用漬水水色侵碧書紙紙面

畧青此驗纔真凡來勿悞使太戰惡吳茱萸葵

防葵

專眼科去肝中火熱煎汁澄淨點洗無時白膜遮明

視物不見者旋効赤腫作痛流淚無休者殊功益男

子精衰止婦人帶下小兒發熱癰瘡亦可作湯浴身

風寒濕痺熱厥後重且卻經云以苦堅之故用

白頭翁黃蘗秦皮之苦劑也久服髮黑亦使身輕○

檉木 多出產江南作湯末可洗敷蛇咬

海桐皮 味苦氣平無毒出雷州嶺南及近海州郡似

桐皮而堅韌白黃枚採無時任煎湯液主霍亂赤白

久痢除疳疔癰牙蟲潰酒治風癱殊功漬水洗赤

眼神効堪作繩索入水常存浸不爛也

桃 味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降陰中陽也無

毒一名越桃霜後收採家園栽者肥大且長比號伏

只供染色之需五綫六綫帶計山谷產者圓小又薄

堪爲入藥之用。七稜九稜方良。折梗及鬚。研碎。纔炒。止血用。須炒黑色。去熱用。但燥而已。留皮除熱於肌表。去皮卻熱於心。胃一說去皮瀉心火留皮瀉肺火其所入之經。手太陰一臟。因輕浮。象肺色赤。象火。故治至高之分。而瀉肺中之火也。本不能作吐。仲景用爲吐藥者。爲邪氣在上。拒而不納。食令上吐。邪因得出。經曰。在高者。因而越之。此之謂也。亦不能利小便。易老用利小便者。實非利小便。乃清肺也。肺氣清而化。則小便從此氣化而出。經曰。膀胱爲津液之府。氣化則能出者。此之謂也。本經又謂治大小腸熱。及胃中熱者。此因辛與庚合。又與丙合。又能泄戊。其先于中州故焉。加生薑橘皮。治嘔噦不

止加厚朴枳實除腹滿而煩加茵陳治濕熱發黃加
甘草治少氣虛滿儻除煩燥於心內須加香豉而建
功蓋煩者氣也燥者慎微不血也氣主肺血主腎故
用梔子治肺煩用香豉治腎燥也若加生薑絞汁尤
治心腹久疼上焦客熱善噉五種黃病竟解去赤目
作障止霍亂轉筋赤白癩瘡酒皰皸鼻五內邪氣悉
能除之丹溪又曰解熱鬱行結氣其性屈曲下行大
能降火從小便泄去人所不知也

枸杞

味甘苦氣微寒無毒近道田側俱有并肅州

並屬者獨佳春生嫩苗作茹莢口秋結赤實入藥益
人依時採收曝乾選用紫熟味甜粗小膏潤者有力

赤黥味淡。顆大枯燥者。無能。今市家多以蜜拌。欺人。不可不細認。衡去爭梗蒂。任作散丸。明耳目安神。耐寒暑延壽。添精固髓。健骨強筋。滋陰不致陰衰。與陽常使陽舉。諺云。離家千里。勿服枸杞。亦以其能助陽也。更止消渴。充補勞傷。**藥**搗汁。注目中。能除風癢。去膜。若作茶。啜喉內。亦解消渴。強陰。諸毒煩悶。善毆麪毒。發熱立卻。**藥**收曝。可同乾地黃作丸。不厭酒吞。甚益陽事。**藥**名**保人**。秋須識。皮膚骨節風能追熱。毒蕪消。瘡腫可散。○**藥**者。性甚寒涼。即此根名。惟取皮用。經入少陰腎臟。併手少陽三焦。解傳尸有汗肌熱。骨蒸。療在表無寒風濕周痺。去五內邪。

熱利大小二便強陰強筋涼血涼骨

謨按本草欵中竹筍立死者既名僊人杖此枸杞
苗莖又名僊人杖藏器拾遺篇內一種菜類亦名
僊人杖何嘗此三物而同立一名古今方書治療
或有用之但僉其名而未細証其物者當考究精
詳必得證治相合庶不失於孟浪也

千夷

味辛氣溫無毒原產漢中川谷今則處處有之
人家園庭亦每種植木高數丈花開兩番臘結苞似
着毛小桃春開花於末葉禿樹北人呼爲木筆南人
喚作迎春花謝纔生葉綴枝葉盛復開花作朶有紅
紫二種多香氣熏人凡收採入藥同煎宜未開花紫

苞莖刷去毛。兇射人肺。摘去心。不致人煩。畏惟薑蒲。蒲黃。黃連。石膏。四藥。惡石脂。使毒窮。止頭腦風疼。面腫。引齒痛。眩冒。除身體寒熱。鼻塞。有香臭。不聞生鬚。髮殺蟲。禁清涕。通竅。久服。明目。下氣。輕身。

酸棗

味酸。氣平。無毒。生河東川澤。秋採。實陰乾。因肉

味酸。故名酸棗。凡伏入藥。碎核取仁。粒匾色丹。亦不易得。市家往往以棘實充賣。不可不細認。焉能治多眠不眠。必分生用炒用。多眠。膽實有熱。生研末。取茶葉薑汁調吞。不眠。膽虛有寒。炒作散。採竹葉煎湯送下。儻和諸藥共劑。却惡防已。須知寧心志。益肝補中。飲虛汗。歐煩止渴。去心腹寒熱。五臟能安。療手足痠。

疼筋骨堪健久服長壽且令人肥核殼燒末水調刺入肉中敷効

杜仲

味辛甘氣平溫氣味俱薄降也陽也無毒漢中

郡名屬四川

產者第一脂厚潤者爲良刮淨麤皮咀成薄

片薑汁潤透連炒去絲凡爲丸散煎湯最惡玄參蛇蛻補中強志益腎添精腰痛不能屈者神功足疼不欲踐者立効除陰囊濕癢止小水夢遺

山茱萸

味酸澁氣平微溫無毒多出漢中遍生山谷

因名蜀棗生青熟紅近霜降摘取陰乾惡桔梗防風防已眞蓼實爲使入肝腎二經合散爲丸惟取皮肉溫肝補腎興陽道以長陰莖益髓固精煖腰膝而助

水臟女人可勻經候老者能節小便除一切風邪卻諸般氣證通九竅去三蟲強力延年輕身明目其核勿用滑精難收

謨按經云滑則氣脫山茱萸之澁以收其滑八味丸用之無非取其益腎而固精也本經謂其九竅堪通是又盡信書則不如無書矣

合歡

即榔欏味甘氣平無毒多產雍洛醴屬每植庭除葉

如槐葉甚密繁木似梧桐但枝軟其枝互相交合風來輒自解開故因名曰合歡俗又呼爲交枝樹也採皮及葉不拘月時利心志補陰安五臟明目令人事

事遂欲時常安樂無憂

採

剪稠膏散腫癰續斷筋

骨藥 搗絞濃汁浣衣服去黑垢微

接骨木

味甘苦氣平有小毒本經云無誤也

木高一二丈

許輕虛無心砍枝挿土即生近京多植花葉並類陸

英水芹故又名木蒴藿也專續筋接骨易起死回生

折傷頻漬酒吞風癢堪作湯浴任煮三次功力一般

產後諸血疾亦效女科方藥中屢用**葉**主瘡生搗汁

飲小兒三歲惟得吐寒熱竟除根反採收亦堪煎服

痰癰瘰癧吐去水腫水脹利消見効即停切勿終劑

○又種折傷木多產資州山陽係藤繞大樹引長

其葉如苘草圓厚八九月內採辛日乾主折傷筋骨

殊功散腫傷血痢立効酒水煮飲並與前同

木槿

木槿 味苦氣平無毒採幹不高在處俱有花淺紅開
開幕飲葉淡綠秋瘁春生沿栽則籬障可爲入藥須
花枝各用**薇**主痢後熱渴令人得眠絞汁度絲軟滑
易絡**薇**主瀉痢腸風澀腸止血作湯代茗風癩漸毆
二者用之並宜炒過

木槿 味苦甘氣平無毒一名隔虎刺花惟生蜀益
近郡川澤傍纔有莖深赤刺多葉青細似檠葉而不
光花淺黃如杏花而作穗三月半後收採陰乾主大
風遍身碎疼療濕痺四肢攣急五痔下血堪止風眩
頭痛能毆

南藤

即丁味辛氣溫無毒出泉州榮州屬生南山山

谷常依南木故名南藤葉如杏葉畧尖苗似馬鞭無節皮色紫褐採無時專治風疼用漬酒服排風邪強腰膝除痺主風血補衰者起陽性烈亦可磨吞令人皓髮變黑○生石上株高大凌冬不凋如枇杷葉但背無毛似椿樹花細碎成簇秋結紅實採隨時湖浙甚多一名鬼目惡大小蘗使五加皮治腎衰脚弱最宜療風淫濕痺並効女人不可久服犯則切切思男殺蟲毒尤靈亦逐風痺積聚

土惟威

味苦辛其氣溫微寒陽中之陰無毒不拘州

土惟威水濱實係蔓生名因直述大如梧子色黑經虛微時採陰乾炒研去衣纔用乃太陽經藥惡

頭石膏主筋骨寒熱濕痺拘攣理本經頭痛頭沉昏
悶利關節長髮髭通九竅去蟲散風澤明目腦鳴仍
止齒動尤堅久服耐老輕身令人光澤脂紋雖胃虛
者禁服恐作禍生痰

牡蠣

味苦氣溫無毒高岸田野俱各叢生種有青

黃兩般惟取青者爲上因莖堅勁故以牡稱鄉人只
呼黃荊洪司常作簪杖八月採實向日曝乾凡入藥
中必須炒研防風爲使單惡石膏下肺氣止欬逆咽
喉通胃氣除寒熱骨節通神見鬼又載僊方得栢實
青箱療頭風甚驗藥主脚氣腫滿濕露濕瘡仍治霍
亂轉筋血淋血痢藥解肌發汗煎服爲宜頭肢體諸

風毆逐悉効○又有**薤**多截莖條磚架火上炙

瀝取兩頭流滴加薑汁傳每瀝一盞二茶匙消痰沫如

神治老人中風失音昏危療小兒發熱驚癇抽搐氣

實能食者宜服氣虛少食者忌之故丹溪云虛痰用

竹瀝實痰用荊瀝二味俱開經絡行血氣要藥也



味甘苦淡氣平降也陽也無毒多產衡山八月

叔採作塊類猪糞故此名猪苓用須去淨黑皮經入

膀胱與腎通淋消腫滿除濕利小便蓋苦泄滯甘助

陽淡利竅故爾衍義又云行水之功居多大能燥亡

津液僅無濕證勿輕用之若久煎嘗損腎昏目



青即味酸氣微寒無毒多生山谷處處有之初

蔓藤依木旋長歲久延引直至杪梢夏開黃赤色因以凌霄爲譽。穉時採曝惟畏鹵鹹取其有守能獨行故用女科調月信治血痛要藥補陰袪捷方崩中帶下立安癥瘕血閉即逐去產乳餘疾散酒釅熱風

藥錄

味苦同煎亦主痿蹇益氣

南燭枝葉

味苦氣平無毒江左吳越最多江東州郡

亦有初生甚矮越四五載僅與菰菜相侔久養漸長歷三十年方成木株而大葉類茶茗圓厚實若菜葉綴多謂本木株而似草類故名南燭草木又名草木之王取汁漬米甚烏炊飯食最甘美南人又曰烏飯樹葉是也治大人一切風疾多採煎湯療小兒悞吞

銅錢單用燒末悅顏色耐老堅筋骨健行久服身輕
不饑多服髮白變黑上元寶經曰子服草木之王氣
與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也

烏藥

一名其味辛氣溫氣厚於味陽也無毒此藥甚賤各

處俱生雞稱天台者香白固優不及海南者功力尤

大根採旁附直根不堪用有二種天台者黑褐堅硬狀取連珠

如銀珠入足少陰腎經及足陽明胃腑因多走泄不

甚剛強諸冷能除凡氣堪順止翻胃消食積作脹縮

小便逐氣衝致疼辟疫瘴時行解蠱毒卒中攻女人

滯凝血氣去小兒積聚蛔蚘猶犬病生摩水嚙効

採入劑下氣亦靈但力緩遲須醋浸炙

茶譜

味甘苦氣微寒無毒江淮閩浙俱有蒙山中

獨佳

茶譜云雅州蒙山有五頂頂上各有茶園具四

爵歌

時出人跡罕到春分前後多採人力俟雷發聲

併步

采到三日而止若獲一兩以木炙水煎飲即驅

宿疾

二所經身三兩輕骨四兩成地僊子聞言初

未全

信近見土人帶筒有真者飲其地僊子聞言初

石蔭

頻類似非原摘嫩芽製成其味異故爾少取

煎飲

氣味果奇始知前語不誣無怪顯名而傳遠也

早採

細者曰芽如雀舌一葉便長其細嫩如針

是為

上品其根幹水脫採鏡者曰茶葉之粗者多雜

土力

皆為餘故也晚採鏡者曰茶葉不可不辨

故經

云採者指人細者茶人一說春入二經絡手足

分已前採者曰茗已後採者曰茶

厥陰

專清頭目利小便善逐痰涎解煩渴下氣消宿

食除

熱治癰瘡薑連黃連同煎止赤白下痢香油調

末敷

湯火炮爛眼目疼嚼貼兩背暑天瀉少加醋吞

熱服宜冷服忌

冷則聚

多服少睡久服消脂

令人

唐母

景云釋滯消壅

一日之利暫佳瘠氣侵精終身之累

斯大損多益少觀此足徵

按茶茗所治本經以清頭目爲上後醫堅洗茶

問苦以泄之之說乃云其體下行如何頭目得清

也殊不知頭目不清多由熱氣上熏用苦泄之則

熱降而上清矣且茶體輕浮採摘之時芽孽初萌

正得春生之氣是以味雖苦而氣則薄乃陰中之

陽可升可降者也故云清利頭目有何悖乎

味辛氣溫大熱屬火有金與水浮也陽中之陽

有毒產自蜀川八月收採顆紅者爲貴口閉者殺

製須炒出汗來去目及去黃殼

凡用先擇去目及殼

勢力妙畢竟投竹筒內以荳蔻之搗去附紅黃殼只取外紅皮旋春旋搗以盡為度宜杏仁為

使畏欬冬雄黃卻心腹冷疼及寒濕痺疼並効殺鬼

疰蠱毒併蟲魚蛇毒尤靈除骨節皮膚死肌瘰癧寒

溫瘡不汗上退兩目腎膜下毆六腑沉寒通氣脉開

鬼門仍調關節堅齒髮煖腰膝尤縮小便理風邪榮

欬逆之邪治噫氣卷中和之氣消水腫黃疸止腸澼

痢紅多食乏氣失明久服黑髮耐老十月勿食傷心

健忘酸目味苦熱辛行水而治水蠱定痰喘劫藥飲

盜汗捷方並宜炒之研末調服和艾葱搗爛少加

醃醋拌勻罨內外腎吊痛殊功敷積疔伏梁氣極驗

亦堪煮飲氣甚辛香○又種秦椒乃出秦嶺氣味俱苦生溫熟寒製法與蜀椒相同顆粒較蜀椒畧大所惡又有三藥防葵雌黃粘蔓主遍身惡風散四肢痛痺滅癰生髮悅色通神治口齒浮腫動搖併喉痺吐逆調產後腹痛餘疾及經閉不通世相傳此椒可制水銀凡誤餌成毒者服即愈也○崖椒施州出上氣喘嗽者須求○雲中生賊風變急者宜服

豆蔻

味辛苦氣溫大熱氣味俱厚可升可降陽中陰也有小毒所產吳地獨妙故加吳字爲名重陽採收依法精製湯泡苦汁七次烘乾杆碎繞煎浸紫白石英惡丹參硝石用蓼實爲使入肝脾腎經主咽益

寒氣噎塞不通散胸膈冷氣窒塞不利驅脾胃停滯
臍腹成陣絞痛逐勝脫受濕陰襲作疝刺疼開腹理
解風邪止嘔逆除霍亂仍順折肝木之性治赤吐酸
水如神厥陰頭疼引經必用氣猛不宜多食今八日
睜口開若久服之亦損元氣腸虛洩者尤忌沾唇爲
速下氣故爾殺寸白三蟲煎服即出療二便閉
格啣口立通並擇向在庚酉取之方獲効驗

乾漆

味辛鹹氣溫屬金有水與火降也陰中陽也無

毒漢蜀多生

欽州

屬南直隸

亦產待季夏方取得陰濕繞

乾

在燥熱晴日反難乾得陰濕雨天和易乾亦物之性也

凡欲買求須驗好歹

濕者以物蘸起細而不斷斷而急收塗諸乾竹蔭地

速乾者纔佳乾者著目視之如鑿音瑩瑩黑若鐵堅剛
狀類蜂房孔孔相隔者方煑濕堪飾器皿乾僅入醫
方搗作碎砂炒以文火畏鷄彈忌油脂又畏壁黃見
則化水漆瘡塗資半夏為使合湯散隨宜追積殺三
蟲補中安五臟療男子風寒濕痺時作癢疼治女人
疝瘕瘕堅不通經脉續筋骨及填髓腦消瘀血專主
絕傷痞結腰痛可驅血氣心痛能止丹溪云性急而
能飛補近用為去積滯之藥若用之中節積去後補
性內行人不知也○**生漆**向樹吸之小竹筒挿樹皮內口含吸之溫
下立下長蟲住痛合青粘作散華佗曾載方中利
五臟殺蟲黑髭髮益氣擠汁塗癰瘡暈漸收葉指

釣藤

味甘苦氣微寒無毒湖南北俱有山上下叢生葉細莖長節間有刺因類鈎鈎故名釣藤三月採收取皮日曝專醫雜病不理別科寒熱驚癇手足瘰癧者急覓胎風客忤口眼抽搐者宜求因莖長中虛可鑿隙盜酒小入每取匙置甕中口含畧吸引之酒出涓涓不斷

雀巢

味辛苦氣溫味厚氣薄降也陰中陽也無毒嶺南州郡俱各有生形類鷄心尖長性如鐵石沉重存坐正穩中實不虛破有錦紋此品方妙逐水穀除痰澀止心痛殺三蟲治後重如神墜諸氣極下專破滯氣下行若服過多又瀉胃中至高氣也

誤按檳榔服之苦以破滯氣辛以散邪氣久服則損真氣多服則瀉至高之氣較諸枳殼青皮此尤甚也夫何嶺南煙瘴之地平居無病之人朝夕如常猛噬云可辟除山嵐瘴氣之疾習以成俗至今爲然吾儒有仕於彼者亦隨其俗而噬之使一身冲和胃氣竟常被其耗折矣正所謂非徒無益而反害之因習之弊死而無悔者焉羅謙甫曰無病服藥如壁裏安鼠誠哉是言也嘗聞用藥如用兵朝廷不得已而行之以禦寇爾若無寇可平而無故發兵不惟空費糧餉抑且害及無辜戒之戒之

本草

味苦辛氣微溫降也無毒樹與檳榔小殊同生

南海諸國傳曰向陰生者曰大腹向陽生者曰橫樹
橫樹尖長大腹圓矮一說橫樹難得真者今市所售
並此代之以薑薑同煎入陳氣藥妙主冷熱諸氣通
大小二腸止霍亂痰隔醋心攻心腹大腸擁毒○寒
外粗殼名大腹樹此樹鳩鳥多棲查毒最能爲害先
浸醇酒後洗豆湯下隔氣亦佳消浮腫尤捷

密蒙花

味甘氣平微寒無毒產自川蜀木高丈餘葉

青冬不凋零花紫瓣多細碎千房一朶故謂密蒙花
花酒浸一宵候乾蜜拌蒸過再向日曝專治眼科去
膚腎青盲止眵淚赤澀消赤脈貫睛內脹除痘毒侵
皆外遮

蜈蚣

味苦溫氣平。然毒木高一丈二丈多植嶺南

江南葉圓大如車輪萃于木杪皮一匝為一節重

累包子黑作房九月收採陰乾入劑血證豆末莖腸

禁洩痢腸風養血治崩中帶下其_反二旬一剉轉後

上生堪作睡薦雨衣以克家用藥末陳者燒研湯調

止鼻洪吐衄殊功。塞腸風崩帶立効

蜈蚣

一名蛇味苦酸氣平屬金與水無毒在處生季秋

採形類象大色黑青黃內多小蟲俗又名百蟲皆也

瘡癰宣痔蠶及小兒面鼻疥瘡治風癰癢瘰癧併大人

五痔下血煎湯洗眼目消赤腫止疼研末泔洗變

皓白成黑專為收斂之劑又禁瀉痢腸虛解消渴生

毒

津卻痰去熱○**回生散**者亦此造成新得五倍子

細磁瓦片又會一七仍搗仍會七次捏成餅即止

用乾倍于水煮為之肺脹喘欬不休噲化數餅即止

巴豆

味厚體重而降有大毒生自巴郡一名巴椒反牽牛

惡莢草忌蘆薈醬豉冷水畏大黃藜蘆黃連得火為

良芫花為使八月收採連殼陰乾有蕩滌攻擊之能

誠斬關奪門之將凡資治病緩急宜分急攻為通利

水穀之方去淨皮心膜油生用緩治為消摩堅積之

劑炒令煙盡黃黑熟加一說炒令黃黑似為太過不

為佳雖可通腸亦堪止瀉世所不能知也丹溪云能

去胃中寒積無寒積者忌之本經又云人吞一枚便欲致死鼠食三載重三十斤物性相耐有如此夫

蘇方木

味甘鹹氣平可升可降陽中之陰無毒多生

海外堪用染紅入藥難取中心煎酒專行積血女科資通月水產後敗血立除外科伏散腫癰跌撲死血即逐同防風散表裏風氣調乳香治口噤風邪

訶梨勒

味苦酸氣溫苦重酸輕性急喜降陰也無毒

嶺南俱生廣州獨勝六棱黑色爲莢火煨去核縱煎消宿食去腹脹且通津液破結氣止久痢兼逐腸風開胃澁腸噎痰住嗽又因其味酸苦有收斂降火之功故能治金傷極驚過腹痛喘急欬無休也

白脂

下鹹氣溫有小毒所在各處有生懷孟州屬

可者獨勝惡麥門一味畏空青二參人參入足厥陰

引經宜以柏實為使種因有二用亦各分理氣疎風

夏夜須覓治齒取積齒積當求去弦去子燥熱

俱同蜜炙酥炙燒灰畧異製度憑證活法在人堪作

散整膏勿為丸煎液搖鼻噴嚏立至敷腫疼痛即除

和生礬吐風痰即稀煉蜜為導即殺穢蟲精

物主風痺死肌利竅通關破癥墮孕○**白脂**乃載

外科聖藥治潰瘍直達潰處成功

白脂

一名白味辛苦氣平無毒性甚疎通水多蟬穴

山谷俱產江南獨多此烈日灼流白脂為外科敷貼

要藥主風痿癱瘓最捷退虛浮水氣尤靈按古歌止
齒痛近世不知誤為松脂明瑩者甚失本經意矣
性溫久病堪敗○**大圖**取仁殺蟲瘡疥癬○**誤**
食令笑不休惟飲地漿其毒即解

莫按楓木連抱大者甚多並結毬而不結子本經
以大楓子內附但載主治餘無一言誠可怪也今
詢市家所得咸云海舶買來疑必外番楓木別有
一種生者不然何獨指此為名而不言他木耶姑
述之以俟識者再教

樹脂一名血歸未辛鹹氣平有小毒出自南蕃諸國
其樹高長婆娑可愛脂從中滴狀類膠

久夕步心成形紅赤與血同色故今番賈收採貨
特名曰血竭又名曰麒麟竭也敲斷而有服光彩
似能射人取摩指甲弦間紅透甲者方妙但與紫釵
璫相類勿誤認假成真書載叮嚀用須仔細治跌撲
傷損療惡毒瘡癰專破積血引膿竟毆邪氣止痛憑
作膏貼任調酒吞

沉香

味辛氣微溫陽也無毒出南海諸國及交廣崖

州木類椿樺節多擇老者砍仆漬以雨水歲久材腐
結使皮木朽殘心節獨存堅黑沉水燂極清烈故名
沉香但種猶有精麤凡買須當選擇辨結鷓鴣斑
者方是辨似牛角黑者爲然二種雖精尚不盡善

儻資主治亦可取功若咀韌糖柔或削自添此又名

黃連也品極精美得者罕稀應病如神入藥甚捷

堪為丸作散忌日曬火烘補相火抑陰助陽養諸氣

通天撒地轉筋吐瀉能止禁口痢痛可毆○又浮而

不沉水者名**黃連**此品最麓半浮半沉與水面平者

名**黃連**此品界次煎香中形如鷄骨者名**黃連**凡

藥性論云此品界次煎香中形如鷄骨者名黃連凡

形如馬蹄者名**黃連**形如牛頭者名**黃連**並與

沉香種同亦皆品之麓者難咀入劑惟黃連衣

謨按衍義云沉香保和衛氣為上品蓋今人多與

烏藥同服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐黃

緩緩。有益無損餘藥不可方也。

檀香

一味辛溫。陽中微陰。無毒。產南海崑崙。以江淮

河朔。專入肺腎臟。通行陽明經。醋摩敷。惡毒止疼水。
煎升胃氣。進食。腹痛霍亂。可卻中惡鬼氣。能破破。又
紫真檀香主惡毒風毒。○**降香**。藥煙直上天。召鶴
成群。盤旋于上。主天行時疫。狂熱。毆宅舍怪異響聲。
小兒帶之辟惡邪氣。

模

按東垣云。檀能調氣而清香。引芳香之物上行。
至於極高之分。最宜燈檠之屬。佐以薑棗。併葛根。
豆蔻。縮砂。益智。通行陽明之經。在胃隔之上。處咽
噎之中。同爲理氣之劑也。

安香

味辛苦氣平無毒惟生海外亦係木脂因香辟邪土人呼爲辟邪樹也七月七日裂其樹皮膠脂如飴隨即湧出堅凝成塊其色黑黃燒煙鬼懼神歡研服邪惡逐鬼胎能下蠱毒可消

蘇合

味甘氣溫無毒來從西域賣自廣東氣極芬香色乃紫赤或云係諸香汁煎合成就一說是獅子屎故飾其名諸論紛紜難指孰是今市賣者多如膏油辟諸惡殺鬼物精邪去三蟲除蠱毒癰疽仍禁毒魔尤通神明

蘇合

即木

味辛苦氣溫微寒無毒來從海船出自波斯木直與類杉皮有甲錯枝傍生發葉皆白正圓

即木脂結成狀若梅花細瓣片片潔淨氣甚薰人市

家多用蜚砂混攪不可不細擇也

蜚砂實重色蒼如砂細碎脂腦輕浮

紫白片片相雜磁罐藏貯燈草務加

不致耗蝕目熱赤疼調

膏點上即止喉痺腫塞搗末吹入立消并毒生管中

連敷漸歿

和眼藥

舌脹出口外多摻自収

五歲方愈仍

治小兒痘瘡心煩狂燥妄語取搗細末猪心血丸濃

煎紫草茸湯送下炭實大粒竟能發透更定心神○

龍腦

出佛誓國中鑽樹取摩一切風氣○根下清

液又名

寶露

堪逐風涎可通閑竅

謨按丹溪云龍腦屬火世知其寒而通利然未達

其熱而輕浮飛越局方但喜香而貴細動輒與麝

同爲法附之。然人身之陽易動，陰易虧。幸思之。節齋又云：龍腦大辛，善走，故能散熱，通利結氣，醫方目痛、喉痺、下疳，多用之者，取辛散也。人欲死者，吞之，氣散，盡也。世人誤以爲寒，不知辛散性甚，似乎涼耳。諸香皆屬陽，豈有香之至者而反寒乎？

香

味辛苦，氣溫，陽也，無毒。亦出波斯國土，赤松木

脂所成，垂滴成珠。綴木未落者，名**珠香**。滴下如乳，鏤

榻地面者，名**覆香**。珠香圓小，光明；榻香大塊，枯黯。珠

香効速，榻香効遲。凡欲用之，不可不擇。箬盛，烘燥，燈

草同播，若合散丸，羅細和入，倘煎湯液，臨熟加調，療

諸般惡瘡，及風水腫毒，定諸經卒痛，併心腹急疼，亦

入敷膏止痛長肉更催生彥且理風邪

雲香

味辛氣溫屬火有金純陽無毒生交趾廣州收

春前秋後形有大小名列雌雄如釘子長

丁香

似棗核大凡資主治母者用多專入腎胃三經

又走太陰肺臟諸香能發凡氣善破口舌氣憤他氣殊功且止吃忒氣逆翻胃嘔霍亂立効蕪除心腹冷疼煖腰膝壯陽殺疳墮堅齒治妳頭綻裂消蠱毒脹膨細末研成猶有兩治婦人陰戶常冷紗囊盛納陰內旋使轉溫老人拔去白鬚薑汁和塗孔中重生即黑

牙痛

止齒痛亦驗

眼

搗敷風腫尤奇

桐葉

一名木

味鹹苦

大寒

無毒

出甘肅州

以西

作驗

其地之上。大皮似白楊。津液滲入地中。乃與土石相着。冬月收採。狀如黃礬。重實而堅。多夾爛木。又若硝石。得水便消。磁罐貯封。勿令熔化。口齒門聖藥。癰瘰毒。仙丹毒。熱腹滿。心煩。水和服之。取吐牛馬急黃黑汗。水研嚙之。即差。火毒。麴毒。並毆金。鐸銀。鐸可用。切勿多服。令吐無休。

阿魏 味辛。氣平。熱。無毒。出波斯國中。生阿盧木內。其木長八九尺。皮色青黃。四季花實俱無。葉如鼠耳。斷其枝梗。汁滴如飴。久乃堅凝。遂名阿魏。唐本註云。體性極臭。而能止臭。亦為奇物也。色黑者力微。黃散者為上。但今市家多煎蒜白假充。不可不細辨。爾凡使

研作粉霜熱酒器上裹過置地待冷入藥隨宜去臭
氣殺諸小蟲下惡氣破凡瘰癧辟瘟禁瘡卻鬼毆邪
蟲毒能消傳尸可滅

盧氏膏

味苦氣寒無毒波斯國土所出木滴脂淚結成

狀類黑錫俗呼象膽

味苦誤服巴豆毒能解除殺蟲

去疳鎮心明目治小兒癩癧驚搐療大人瘡癰痔瘡
癰發頸間同甘草研勻敷効蠶生齒縫以鹽湯漱淨
點差

女藥

味苦辛氣平無毒黃黑類安息香出產自波斯

國亦木脂液逐日結凝成塊大小不侔斷碎光瑩可

自細入藥製

此香主墜墮跌打傷療腫疽瘡

胃潰腐血立止 痛如神

木鼈

味甘氣溫無毒朗州屬

所生藤莖甚大黃

花綠葉子若稻麥生青熟紅肉上有刺其核類鼈故
此得名消腫突惡瘡除黥黯粉刺兩勝蚌毒立効雙
乳癰赤殊功止腰疼主折損匪專追毒亦可生肌

謨按烏頭毗穗亦名木鼈子兩物一名不可不識
但此專入外科而有追毒之効彼則徒載其名全
無治病之能非比僊人杖三物同名而各有用也

榆莢

味辛氣平無毒產河東河西有種大種小

榆莢

比榆莢大甚氣臭如狐音難聞較榆莢小

差

一說此即

味辛溫善噉用凡資治療取大宜陳但

市收藏多以鹽漬殊失氣味入藥無功故求買必擇
氣腥者為良儻修合務經火煨過繞用主五內邪氣
殺寸白三蟲化食除腸風逐冷止心痛散皮膚骨節
風濕療痔瘻疥癬瘡瘕

鹽丸

味苦鹹氣寒有小毒係竹之苓苗蔓鮮有建平

直隸出累累相連狀如丸因而名此入藥炮用其草

浸一宿亦者殺人白者惡為蓄毒根使厚朴芫花

葛胃熱可鮮蟲毒能毆殺三蟲仍殺白蟲利丈夫不

利女子非利益之利主癰腫疔走癰汗出惡風又作

摩積之膏專卻小兒百病久服陰痿尤宜慎之

味辛氣溫禹益有火陽也無江南深山多

方試植株類松而勁直葉附枝生老刺針凌冬不
周隨時收採煎服主心腹脹痛及卒暴心痛殊功淋
洗療風癰癢瘡併延片漆瘡立効國煮漫捋脚氣腫
痛國煎吞治心肺卒疼生老杉

樹食子無味苦氣溫無毒出自西戎樹極高大葉似
桃長綠花瓣白心紅實結圓類彈丸初青熟漸黃白
蟲蝕成孔眼者入藥紋細無秋米者尤佳漿水浸砂
盆磙者石上研盡切忌犯銅鐵濕須火上焙乾益血
生精安神和氣燒黑灰浴陰毒合他藥染髮續治瘡
潰肌肉不生主腹冷滑利不禁

樹食味苦氣寒無毒岸側道傍在處俱植木高丈許

秋瘁春榮初生黃莖是○漸乾為○能治濕痺瘰癧急
及貼灸瘡多積瘡作腫眠柔軟清涼尤妙○煎水洗
騾馬疥癩瘡立愈及療心腹內血止皮○煮湯浴嬰
孩寒熱疾即差更治風毒癰瘡去瘀○理齒痛而漱
出疳涎○主潰癰而逐去膿血○結砂子○除
渴消○煎濃風濕疥瘍浴効

便毒味甘氣溫無毒交趾多生嶺南亦有新採香
潤陳久乾枯用須慢火微煨去殼便可爵食或和諸
藥憑作散丸去白濁除五淋殺蛔蟲止瀉痢因郭使
君原用以治小兒後人竟名之曰使君子也